














COMBIVIR® + VIRACEPT®

zidovudine (ZDV)+ lamivudine (3TC)
inhibiteur nucléosidique de la transcriptase inverse (INTI)
 nelfinavir (NFV) inhibiteur de la protéase (IP)

Médicament (taille réelle)	 COMBIVIR	 VIRACEPT
Conservation	Température ambiante (< 25°C) à l'abri de la lumière	Température ambiante (< 25°C)
Disponibilité	Ville – Hôpital Prescription initiale hospitalière	Ville – Hôpital Prescription initiale hospitalière

**En cas d'oubli, prendre dès que possible la dose oubliée, puis poursuivre le traitement comme auparavant.
 Ne pas prendre de dose double pour compenser la dose oubliée.**

Posologie usuelle	 lever	 petit déjeuner	 matinée	 midi	 après-midi	 dîner	 coucher	Administration
Combivir®								- Une prise toutes les 12 heures, sans contraintes alimentaires
Viracept®								- Administration au cours des repas.

En pratique	<p>Combivir : une baisse importante des globules blancs ou rouges a pu se produire chez certains patients (principalement ceux à un stade avancé de la maladie) sous zidovudine, présente dans Combivir. C'est pourquoi le suivi sanguin est nécessaire tout au long du traitement.</p> <p>Les enfants de moins de 12 ans devront prendre séparément les deux molécules (Epivir et Rétrovir) contenues dans Combivir.</p> <p>Viracept : l'effet indésirable le plus fréquent est la survenue de diarrhées. On peut aussi le prendre trois fois par jour (matin, midi et soir), pendant les repas, à raison de 3 comprimés par prise.</p>
-------------	--