

















## EPIVIR® + ZERIT® + CRIXIVAN®

lamivudine (3TC) inhibiteur nucléosidique de la transcriptase inverse (INTI)  
stavudine (d4T) inhibiteur nucléosidique de la transcriptase inverse (INTI)  
indinavir (IDV) inhibiteur de la protéase (IP)

Médicament (taille réelle)	 <b>EPIVIR</b>	 <b>ZERIT</b>	 <b>CRIXIVAN</b>
Conservation	Température ambiante (< 25°C) à l'abri de la lumière	Température ambiante (< 25°C)	Température ambiante (< 25°C) Conserver les gélules protégées de l'humidité dans le récipient d'origine bien fermé (bouchon dessiccateur)
Disponibilité	Ville – Hôpital Prescription initiale hospitalière	Ville – Hôpital Prescription initiale hospitalière	Ville – Hôpital Prescription initiale hospitalière

**En cas d'oubli, prendre dès que possible la dose oubliée, puis poursuivre le traitement comme auparavant. Ne pas prendre de dose double pour compenser la dose oubliée.**

Posologie usuelle	 lever	 petit déjeuner	 matinée	 midi	 après-midi	 dîner	 coucher	Administration
<b>Epivir®</b>								- Administration sans contraintes alimentaires
<b>Zerit®</b>								- Une prise toutes les 12 heures, sans contraintes alimentaires. - Les gélules contiennent du lactose (attention en cas d'allergie).
<b>Crixivan®</b>								- Une prise toutes les 8 heures. Administration à <b>jeun</b> 1 h avant ou 2 h après les repas

<b>En pratique</b>	<p><b>Zerit</b> : vous devez contacter votre médecin si les événements suivants surviennent :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>engourdissement permanent, fourmillements ou douleurs dans les pieds et/ou dans les mains (cela peut indiquer le début d'une neuropathie périphérique, un effet indésirable au niveau des nerfs)</li> <li>douleur abdominale, nausées ou vomissements (ce qui peut indiquer qu'une pancréatite ou un dysfonctionnement hépatique)</li> </ul> <p><b>Crixivan</b> : il faut boire au minimum 1,5 litre d'eau par jour, au cours de la journée, pour éviter l'apparition de calculs rénaux. La survenue d'effets indésirables pourra conduire votre médecin à procéder à un dosage de Crixivan.</p>
--------------------	---