















# COMBIVIR® + CRIXIVAN®

**zidovudine (ZDV)+ lamivudine (3TC)**  
**inhibiteur nucléosidique de la transcriptase inverse (INTI)**  
**indinavir (IDV) inhibiteur de la protéase (IP)**

Médicament (taille réelle)	 <b>COMBIVIR</b>	 <b>CRIXIVAN</b>
Conservation	Température ambiante (< 25°C) à l'abri de la lumière	Température ambiante (< 25°C) Conserver les gélules protégées de l'humidité dans le récipient d'origine bien fermé (bouchon dessiccateur)
Disponibilité	Ville – Hôpital Prescription initiale hospitalière	Ville – Hôpital Prescription initiale hospitalière

**En cas d'oubli, prendre dès que possible la dose oubliée, puis poursuivre le traitement comme auparavant.**  
**Ne pas prendre de dose double pour compenser la dose oubliée.**

Posologie usuelle	 lever	 petit déjeuner	 matinée	 midi	 après-midi	 dîner	 coucher	Administration
Combivir®								- Une prise toutes les 12 heures, sans contraintes alimentaires
Crixivan®								- Une prise toutes les 8 heures. Administration à jeun 1 h avant ou 2 h après les repas

En pratique	<p><b>Combivir</b> : une baisse importante des globules blancs ou rouges a pu se produire chez certains patients (principalement ceux à un stade avancé de la maladie) sous zidovudine, présente dans Combivir. <b>C'est pourquoi le suivi sanguin est nécessaire tout au long du traitement.</b></p> <p><b>La survenue d'effets indésirables pourra conduire votre médecin à procéder à un dosage de Crixivan.</b></p> <p>Les enfants de moins de 12 ans devront prendre séparément les deux molécules (Epivir et Rétrovir) contenues dans Combivir.</p> <p><b>Crixivan</b> : il faut boire au minimum 1,5 litre d'eau par jour, au cours de la journée, pour éviter l'apparition de calculs rénaux.</p>
-------------	---