














COMBIVIR® + KALETRA®

zidovudine (ZDV)+ lamivudine (3TC)
 inhibiteur nucléosidique de la transcriptase inverse (INTI)
 lopinavir + ritonavir (LPV/r) - inhibiteur de la protéase (IP)

Médicament (taille réelle)	 COMBIVIR	 KALETRA
Conservation	Température ambiante (< 25°C) à l'abri de la lumière	Entre 2 et 8°C ou 42 jours à température ambiante (< 25°C)
Disponibilité	Ville – Hôpital Prescription initiale hospitalière	Ville – Hôpital Prescription initiale hospitalière

**En cas d'oubli, prendre dès que possible la dose oubliée, puis poursuivre le traitement comme auparavant.
 Ne pas prendre de dose double pour compenser la dose oubliée.**

Posologie usuelle	 lever	 petit déjeuner	 matinée	 midi	 après-midi	 dîner	 coucher	Administration
Combivir®								- Une prise toutes les 12 heures, sans contraintes alimentaires
Kaletra®								- Administration au cours des repas ou avec un peu de nourriture.

En pratique	<p>Combivir : une baisse importante des globules blancs ou rouges a pu se produire chez certains patients (principalement ceux à un stade avancé de la maladie) sous zidovudine, présente dans Combivir. C'est pourquoi le suivi sanguin est nécessaire tout au long du traitement.</p> <p>Les enfants de moins de 12 ans devront prendre séparément les deux molécules (Epivir et Rétrovir) contenues dans Combivir.</p> <p>Kaletra se conserve à une température entre 2 et 8°C ou 42 jours à température ambiante (< 25°C). Ses effets secondaires les plus fréquents sont digestifs (diarrhées).</p>
-------------	--