
















## VIDEX® + ZERIT® + KALETRA®

**didanosine (ddI) inhibiteur nucléosidique de la transcriptase inverse (INTI)**  
**stavudine (d4T) inhibiteur nucléosidique de la transcriptase inverse (INTI)**  
**lopinavir + ritonavir (LPV/r) inhibiteur de la protéase (IP)**

Médicament (taille réelle)	 <b>VIDEX</b>	 <b>ZERIT</b>	 <b>KALETRA</b>
Conservation	Entre 15-25°C dans le flacon d'origine	Température ambiante (< 25°C)	<b>Entre 2 et 8°C</b> ou 42 jours à température ambiante (< 25°C)
Disponibilité	Ville – Hôpital Prescription initiale hospitalière	Ville – Hôpital Prescription initiale hospitalière	Ville – Hôpital Prescription initiale hospitalière

**En cas d'oubli, prendre dès que possible la dose oubliée, puis poursuivre le traitement comme auparavant. Ne pas prendre de dose double pour compenser la dose oubliée.**

Posologie usuelle	 lever	 petit déjeuner	 matinée	 midi	 après-midi	 dîner	 coucher	Administration
Videx®								- Administration <b>à jeun</b> 2 heures avant ou 2 heures après le repas. A intervalle d'une prise de médicament pouvant interférer avec son absorption.
Zerit®								- Une prise toutes les 12 heures, sans contraintes alimentaires. - Les gélules contiennent du lactose (attention en cas d'allergie).
Kaletra®								- Administration <b>au cours des repas</b> ou avec un peu de nourriture.

En pratique	<p>Avec Videx et Zerit, vous devez contacter votre médecin si les événements suivants surviennent :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>engourdissement permanent, fourmillements ou douleurs dans les pieds et/ou dans les mains</b> (cela peut indiquer le début d'une neuropathie périphérique, un effet indésirable au niveau des nerfs)</li> <li>• <b>douleur abdominale, nausées ou vomissements</b> (ce qui peut indiquer qu'une pancréatite ou un dysfonctionnement hépatique)</li> </ul> <p><b>Videx doit toujours être pris à jeun</b> : le repas peut diminuer son absorption, et donc son efficacité. <b>Eviter les boissons acides (jus de fruit car dégradation rapide du produit) ou gazeuses.</b></p> <p><b>Kaletra se conserve à une température entre 2 et 8°C ou 42 jours à température ambiante (&lt; 25°C).</b> Ses effets secondaires les plus fréquents sont digestifs (diarrhées).</p>
-------------	--