
















# VIDEX® + ZIAGEN® + KALETRA®

**didanosine (ddI) inhibiteur nucléosidique de la transcriptase inverse (INTI)**  
**abacavir (ABC) inhibiteur nucléosidique de la transcriptase inverse (INTI)**  
**lopinavir + ritonavir (LPV/r) inhibiteur de la protéase (IP)**

Médicament (taille réelle)	 <b>VIDEX</b>	 <b>ZIAGEN</b>	 <b>KALETRA</b>
Conservation	Entre 15-25°C dans le flacon d'origine	Température ambiante (< 25°C)	Entre 2 et 8°C ou 42 jours à température ambiante (< 25°C)
Délivrance	Ville – Hôpital Prescription initiale hospitalière	Ville – Hôpital Prescription initiale hospitalière	Ville – Hôpital Prescription initiale hospitalière

**En cas d'oubli, prendre dès que possible la dose oubliée, puis poursuivre le traitement comme auparavant. Ne pas prendre de dose double pour compenser la dose oubliée.**

Posologie usuelle	 lever	 petit déjeuner	 matinée	 midi	 après-midi	 dîner	 coucher	Administration
Videx®								- Administration <b>à jeun</b> 2 heures avant ou 2 heures après le repas. A intervalle d'une prise de médicament pouvant interférer avec son absorption.
Ziagen®								- Une prise toutes les 12 heures, sans contraintes alimentaires
Kaletra®								- Administration <b>au cours des repas</b> ou avec un peu de nourriture.

<b>En pratique</b>	<p><b>Videx doit toujours être pris à jeun</b> : le repas peut diminuer son absorption, et donc son efficacité. Vous devez contacter votre médecin si les événements suivants surviennent :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>engourdissement permanent, fourmillements ou douleurs dans les pieds et/ou dans les mains (cela peut indiquer le début d'une neuropathie périphérique, un effet indésirable au niveau des nerfs)</li> <li>douleur abdominale, nausées ou vomissements (ce qui peut indiquer qu'une pancréatite ou un dysfonctionnement hépatique)</li> </ul> <p>Eviter les boissons acides (jus de fruit car dégradation rapide du produit) ou gazeuses.</p> <p><b>Ziagen : (voir fiche produit)</b></p> <p>Les patients prenant Ziagen peuvent développer une réaction allergique grave nécessitant l'arrêt définitif du traitement. Conservez sur vous en permanence la carte de mise en garde incluse dans la boîte de Ziagen</p> <p>Si vous avez arrêté Ziagen en raison d'une réaction d'hypersensibilité, vous ne devez jamais reprendre Ziagen: cela peut entraîner en quelques heures une mise en jeu du pronostic vital (avec hypotension artérielle), voire le décès.</p> <p><b>Kaletra se conserve à une température entre 2 et 8°C ou 42 jours à température ambiante (&lt; 25°C).</b> Ses effets secondaires les plus fréquents sont digestifs (diarrhées).</p>
--------------------	---