
















# EPIVIR® + ZERIT® + KALETRA®

**lamivudine (3TC) inhibiteur nucléosidique de la transcriptase inverse (INTI)**  
**stavudine (d4T) inhibiteur nucléosidique de la transcriptase inverse (INTI)**  
**lopinavir + ritonavir (LPV/r) inhibiteur de la protéase (IP)**

|                            |   |  |  |
|----------------------------|---|--|--|
| Médicament (taille réelle) |  <b>EPIVIR</b> |  <b>ZERIT</b> |  <b>KALETRA</b> |
| Conservation               | Température ambiante (< 25°C) à l'abri de la lumière  | Température ambiante (< 25°C).   | Entre <b>2 et 8°C</b> ou 42 jours à température ambiante (< 25°C)                                  |
| Disponibilité              | Ville – Hôpital<br>Prescription initiale hospitalière   | Ville – Hôpital<br>Prescription initiale hospitalière  | Ville – Hôpital<br>Prescription initiale hospitalière  |

**En cas d'oubli, prendre dès que possible la dose oubliée, puis poursuivre le traitement comme auparavant. Ne pas prendre de dose double pour compenser la dose oubliée.**

| Posologie usuelle |  lever |  petit déjeuner |  matinée |  midi |  après-midi |  dîner |  coucher | Administration  |
|-------------------|---|--|---|--|--|--|---|---|
| Epivir®           |   |  |   |  |  |        |   | - Administration sans contraintes alimentaires  |
| Zerit®            |   |                 |   |  |  |        |   | - Une prise toutes les 12 heures, sans contraintes alimentaires.<br>- Les gélules contiennent du lactose (attention en cas d'allergie). |
| Kaletra®          |   |                 |   |  |  |        |   | - Administration <b>au cours des repas</b> ou avec un peu de nourriture.  |

|             |  |
|-------------|--|
| En pratique | <p><b>Zerit</b> : vous devez contacter votre médecin si les événements suivants surviennent :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>engourdissement permanent, fourmillements ou douleurs dans les pieds et/ou dans les mains (cela peut indiquer le début d'une neuropathie périphérique, un effet indésirable au niveau des nerfs)</li> <li>douleur abdominale, nausées ou vomissements (ce qui peut indiquer qu'une pancréatite ou un dysfonctionnement hépatique)</li> </ul> <p><b>Kaletra</b> se conserve à une température entre 2 et 8°C ou 42 jours à température ambiante (&lt; 25°C). Ses effets secondaires les plus fréquents sont digestifs (diarrhées).</p> |
|-------------|--|