













# COMBIVIR® + SUSTIVA®

zidovudine (ZDV)+ lamivudine (3TC)  
**inhibiteur nucléosidique de la transcriptase inverse (INTI)**  
 éfavirenz (EFV) **inhibiteur non nucléosidique de la transcriptase inverse (INNTI)**

Médicament (taille réelle)	 <b>COMBIVIR</b>	 <b>SUSTIVA</b>
Conservation	Température ambiante (< 25°C) à l'abri de la lumière	Température ambiante (< 25°C)
Disponibilité	Ville – Hôpital Prescription initiale hospitalière	Ville – Hôpital Prescription initiale hospitalière

**En cas d'oubli, prendre dès que possible la dose oubliée, puis poursuivre le traitement comme auparavant. Ne pas prendre de dose double pour compenser la dose oubliée.**

Posologie usuelle	 lever	 petit déjeuner	 matinée	 midi	 après-midi	 dîner	 coucher	Administration
Combivir®								- Une prise toutes les 12 heures, sans contraintes alimentaires
Sustiva®								- Administration de préférence le soir au coucher, avec ou sans aliments - Prudence chez les utilisateurs de machines et les conducteurs

<b>En pratique</b>	<p><b>Combivir</b> : une baisse importante des globules blancs ou rouges a pu se produire chez certains patients (principalement ceux à un stade avancé de la maladie) sous zidovudine, présente dans Combivir. <b>C'est pourquoi le suivi sanguin est nécessaire tout au long du traitement.</b></p> <p><b>Les enfants de moins de 12 ans devront prendre séparément les deux molécules (Epivot et Rétrovir) contenues dans Combivir.</b></p> <p><b>Sustiva est contre-indiqué chez la femme enceinte.</b> Des symptômes affectant le système nerveux (sensations vertigineuses, insomnies, somnolence, problèmes de concentration et cauchemars) peuvent apparaître dès le premier jour de traitement. Ils ont tendance à disparaître chez la grande majorité des patients en quelques semaines, mais peuvent se prolonger au-delà.</p> <p>Des symptômes plus sévères (troubles de l'humeur, idées suicidaires, comportement coléreux) peuvent également survenir. Contacter votre médecin si vous ressentez de tels symptômes.</p>
--------------------	---