















## VIDEX® + ZERIT® + SUSTIVA®

**didanosine (ddI) inhibiteur nucléosidique de la transcriptase inverse (INTI)**  
**stavudine (d4T) inhibiteur nucléosidique de la transcriptase inverse (INTI)**  
**éfavirenz (EFV) inhibiteur non nucléosidique de la transcriptase inverse (INNTI)**

Médicament (taille réelle)	 <b>VIDEX</b>	 <b>ZERIT</b>	 <b>SUSTIVA</b>
Formes galéniques	Entre 15-25°C dans le flacon d'origine	Température ambiante (< 25°C)	Température ambiante (< 25°C)
Disponibilité	Ville – Hôpital Prescription initiale hospitalière	Ville – Hôpital Prescription initiale hospitalière	Ville – Hôpital Prescription initiale hospitalière

**En cas d'oubli, prendre dès que possible la dose oubliée, puis poursuivre le traitement comme auparavant. Ne pas prendre de dose double pour compenser la dose oubliée.**

Posologie usuelle	 lever	 petit déjeuner	 matinée	 midi	 après-midi	 dîner	 coucher	Administration
Videx®								- Administration à <b>jeun</b> 2 heures avant ou 2 heures après le repas. A intervalle d'une prise de médicament pouvant interférer avec son absorption.
Zerit®								- Une prise toutes les 12 heures, sans contraintes alimentaires. - Les gélules contiennent du lactose (attention en cas d'allergie).
Sustiva®								- Administration <b>de préférence le soir au coucher</b> , avec ou sans aliments - Prudence chez les utilisateurs de machines et les conducteurs

En pratique	<p>Avec Videx et Zerit, vous devez contacter votre médecin si les événements suivants surviennent :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>engourdissement permanent, fourmillements ou douleurs dans les pieds et/ou dans les mains</b> (cela peut indiquer le début d'une neuropathie périphérique, un effet indésirable au niveau des nerfs)</li> <li>• <b>douleur abdominale, nausées ou vomissements</b> (ce qui peut indiquer qu'une pancréatite ou un dysfonctionnement hépatique)</li> </ul> <p><b>Videx doit toujours être pris à jeun</b> : le repas peut diminuer son absorption, et donc son efficacité. <b>Eviter les boissons acides (jus de fruit car dégradation rapide du produit) ou gazeuses.</b></p> <p><b>Sustiva est contre-indiqué chez la femme enceinte.</b> Des symptômes affectant le système nerveux (sensations vertigineuses, insomnies, somnolence, problèmes de concentration et cauchemars) peuvent apparaître dès le premier jour de traitement. Ils ont tendance à disparaître chez la grande majorité des patients en quelques semaines, mais peuvent se prolonger au-delà.</p> <p>Des symptômes plus sévères (troubles de l'humeur, idées suicidaires, comportement coléreux) peuvent également survenir. Contacter votre médecin si vous ressentez de tels symptômes.</p>
-------------	--