














EPIVIR® + VIDEX® + SUSTIVA®

lamivudine (3TC) inhibiteur nucléosidique de la transcriptase inverse (INTI)
didanosine (ddI) inhibiteur nucléosidique de la transcriptase inverse (INTI)
éfavirenz (EFV) inhibiteur non nucléosidique de la transcriptase inverse (INNTI)

Médicament (taille réelle)	 EPIVIR	 VIDEX	 SUSTIVA
Conservation	Température ambiante (< 25°C) à l'abri de la lumière	Entre 15-25°C dans le flacon d'origine	Température ambiante (< 25°C)
Disponibilité	Ville – Hôpital Prescription initiale hospitalière	Ville – Hôpital Prescription initiale hospitalière	Ville – Hôpital Prescription initiale hospitalière

En cas d'oubli, prendre dès que possible la dose oubliée, puis poursuivre le traitement comme auparavant.
Ne pas prendre de dose double pour compenser la dose oubliée.

Posologie usuelle	 lever	 petit déjeuner	 matin ée	 midi	 après-midi	 dîner	 coucher	Administration
Epivir®								- Administration sans contraintes alimentaires
Videx®								- Administration à jeun 2 heures avant ou 2 heures après le repas. A intervalle d'une prise de médicament pouvant interférer avec son absorption. - Gélules : prise simultanée possible avec CRIVAN®. Ne pas ouvrir la gélule avant absorption. Tenir compte de l'apport en ions sodium et magnésium (11,5 et 8,6 mEq/gélule) en cas d'insuffisance rénale.
Sustiva®								- Administration de préférence le soir au coucher , avec ou sans aliments - Prudence chez les utilisateurs de machines et les conducteurs

En pratique	<p>Videx doit toujours être pris à jeun : le repas peut diminuer son absorption, et donc son efficacité. Vous devez contacter votre médecin si les événements suivants surviennent :</p> <ul style="list-style-type: none"> • engourdissement permanent, fourmillements ou douleurs dans les pieds et/ou dans les mains (cela peut indiquer le début d'une neuropathie périphérique, un effet indésirable au niveau des nerfs) • douleur abdominale, nausées ou vomissements (ce qui peut indiquer qu'une pancréatite ou un dysfonctionnement hépatique) <p>Eviter les boissons acides (jus de fruit car dégradation rapide du produit) ou gazeuses.</p> <p>Sustiva est contre-indiqué chez la femme enceinte. Des symptômes affectant le système nerveux (sensations vertigineuses, insomnies, somnolence, problèmes de concentration et cauchemars) peuvent apparaître dès le premier jour de traitement. Ils ont tendance à disparaître chez la grande majorité des patients en quelques semaines, mais peuvent se prolonger au-delà.</p> <p>Des symptômes plus sévères (troubles de l'humeur, idées suicidaires, comportement coléreux) peuvent également survenir. Contacter votre médecin si vous ressentez de tels symptômes.</p>
-------------	--