




## EPIVIR® + ZIAGEN® + SUSTIVA®












lamivudine (3TC) inhibiteur nucléosidique de la transcriptase inverse (INTI)

abacavir (ABC) inhibiteur nucléosidique de la transcriptase inverse (INTI)

éfavirenz (EFV) inhibiteur non nucléosidique de la transcriptase inverse (INNTI)

Médicament (taille réelle)	 <b>EPIVIR</b>	 <b>ZIAGEN</b>	 <b>SUSTIVA</b>
Conservation	Température ambiante (< 25°C) à l'abri de la lumière	Température ambiante (< 25°C)	Température ambiante (< 25°C)
Disponibilité	Ville – Hôpital Prescription initiale hospitalière	Ville – Hôpital Prescription initiale hospitalière	Ville – Hôpital Prescription initiale hospitalière

**En cas d'oubli, prendre dès que possible la dose oubliée, puis poursuivre le traitement comme auparavant. Ne pas prendre de dose double pour compenser la dose oubliée.**

Posologie usuelle	 lever	 petit déjeuner	 matinée	 midi	 après-midi	 dîner	 coucher	Administration
Epivir®								- Administration sans contraintes alimentaires
Ziagen®								- Une prise toutes les 12 heures, sans contraintes alimentaires
Sustiva®								- Administration de préférence le soir au coucher, avec ou sans aliments - Prudence chez les utilisateurs de machines et les conducteurs

<b>En pratique</b>	<p><b>Ziagen : (voir fiche produit)</b></p> <p>Les patients prenant Ziagen peuvent développer une réaction allergique grave nécessitant l'arrêt définitif du traitement. Conservez sur vous en permanence la carte de mise en garde incluse dans la boîte de Ziagen</p> <p>Si vous avez arrêté Ziagen en raison d'une réaction d'hypersensibilité, vous ne devez jamais reprendre Ziagen: cela peut entraîner en quelques heures une mise en jeu du pronostic vital (avec hypotension artérielle), voire le décès.</p> <p><b>Sustiva est contre-indiqué chez la femme enceinte.</b> Des symptômes affectant le système nerveux (sensations vertigineuses, insomnies, somnolence, problèmes de concentration et cauchemars) peuvent apparaître dès le premier jour de traitement. Ils ont tendance à disparaître chez la grande majorité des patients en quelques semaines, mais peuvent se prolonger au-delà.</p> <p>Des symptômes plus sévères (troubles de l'humeur, idées suicidaires, comportement coléreux) peuvent également survenir. Contacter votre médecin si vous ressentez de tels symptômes.</p>
--------------------	---