













COMBIVIR® + VIDEX®

zidovudine (ZDV)+ lamivudine (3TC)
inhibiteur nucléosidique de la transcriptase inverse (INTI)
didanosine (ddI) inhibiteur nucléosidique de la transcriptase inverse (INTI)

Médicament (taille réelle)	 COMBIVIR	 VIDEX
Conservation	Température ambiante (< 25°C) à l'abri de la lumière	Entre 15-25°C dans le flacon d'origine
Disponibilité	Ville – Hôpital Prescription initiale hospitalière	Ville – Hôpital Prescription initiale hospitalière

En cas d'oubli, prendre dès que possible la dose oubliée, puis poursuivre le traitement comme auparavant.
Ne pas prendre de dose double pour compenser la dose oubliée.

Posologie usuelle	 lever	 petit déjeuner	 matinée	 midi	 après-midi	 dîner	 coucher	Administration
Combivir®								- Une prise toutes les 12 heures, sans contraintes alimentaires
Videx®								- Administration à jeun 2 heures avant ou 2 heures après le repas. A intervalle d'une prise de médicament pouvant interférer avec son absorption. - Gélules : prise simultanée possible avec CRIVAN®. Ne pas ouvrir la gélule avant absorption. Tenir compte de l'apport en ions sodium et magnésium (11,5 et 8,6 mEq/gélule) en cas d'insuffisance rénale.

En pratique	<p>Combivir : une baisse importante des globules blancs ou rouges a pu se produire chez certains patients (principalement ceux à un stade avancé de la maladie) sous zidovudine, présente dans Combivir. C'est pourquoi le suivi sanguin est nécessaire tout au long du traitement.</p> <p>Les enfants de moins de 12 ans devront prendre séparément les deux molécules (Epiriv et Rétrovir) contenues dans Combivir.</p> <p>Videx doit toujours être pris à jeun : le repas peut diminuer son absorption, et donc son efficacité. Vous devez contacter votre médecin si les événements suivants surviennent :</p> <ul style="list-style-type: none"> • engourdissement permanent, fourmillements ou douleurs dans les pieds et/ou dans les mains (cela peut indiquer le début d'une neuropathie périphérique, un effet indésirable au niveau des nerfs) • douleur abdominale, nausées ou vomissements (ce qui peut indiquer qu'une pancréatite ou un dysfonctionnement hépatique). <p>Eviter les boissons acides (jus de fruit car dégradation rapide du produit) ou gazeuses.</p>
-------------	--