
















EPIVIR® + ZERIT® + ZIAGEN®

lamivudine (3TC) inhibiteur nucléosidique de la transcriptase inverse (INTI)
stavudine (d4T) inhibiteur nucléosidique de la transcriptase inverse (INTI)
abacavir (ABC) inhibiteur nucléosidique de la transcriptase inverse (INTI)

Médicament (taille réelle)	 EPIVIR	 ZERIT	 ZIAGEN
Conservation	Température ambiante (< 25°C) à l'abri de la lumière	Température ambiante (< 25°C).	Température ambiante (< 25°C).
Disponibilité	Ville – Hôpital Prescription initiale hospitalière	Ville – Hôpital Prescription initiale hospitalière	Ville – Hôpital Prescription initiale hospitalière

En cas d'oubli, prendre dès que possible la dose oubliée, puis poursuivre le traitement comme auparavant. Ne pas prendre de dose double pour compenser la dose oubliée.

Posologie usuelle	 lever	 petit déjeuner	 matinée	 midi	 après-midi	 dîner	 coucher	Administration
Epivir®								- Administration sans contraintes alimentaires
Zerit®								- Une prise toutes les 12 heures, sans contraintes alimentaires. - Les gélules contiennent du lactose (attention en cas d'allergie).
Ziagen®								- Une prise toutes les 12 heures, sans contraintes alimentaires

En pratique	<p>Zerit : vous devez contacter votre médecin si les événements suivants surviennent :</p> <ul style="list-style-type: none"> engourdissement permanent, fourmillements ou douleurs dans les pieds et/ou dans les mains (cela peut indiquer le début d'une neuropathie périphérique, un effet indésirable au niveau des nerfs) <p>douleur abdominale, nausées ou vomissements (ce qui peut indiquer qu'une pancréatite ou un dysfonctionnement hépatique)</p> <p>Ziagen : (voir fiche produit)</p> <p>Les patients prenant Ziagen peuvent développer une réaction allergique grave nécessitant l'arrêt définitif du traitement. Conservez sur vous en permanence la carte de mise en garde incluse dans la boîte de Ziagen</p> <p>Si vous avez arrêté Ziagen en raison d'une réaction d'hypersensibilité, vous ne devez jamais reprendre Ziagen: cela peut entraîner en quelques heures une mise en jeu du pronostic vital (avec hypotension artérielle), voire le décès.</p>
--------------------	---