


















# COMBIVIR® + CRIXIVAN® + NORVIR®

zidovudine (ZDV)+ lamivudine (3TC)  
 inhibiteur nucléosidique de la transcriptase inverse (INTI)  
 indinavir (IDV) inhibiteur de la protéase (IP)  
 ritonavir (RTV) inhibiteur de la protéase (IP)

Médicament (taille réelle)	 <b>COMBIVIR</b>	 <b>CRIXIVAN</b>	 <b>NORVIR</b>
Conservation	Température ambiante (< 25°C) à l'abri de la lumière	Température ambiante (< 25°C) Conserver les gélules protégées de l'humidité dans le récipient d'origine bien fermé (bouchon dessiccateur)	Entre <b>2 et 8°C</b> , ou 30 jours à température ambiante (25°C)
Disponibilité	Ville – Hôpital Prescription initiale hospitalière	Ville – Hôpital Prescription initiale hospitalière	Ville – Hôpital Prescription initiale hospitalière

**En cas d'oubli, prendre dès que possible la dose oubliée, puis poursuivre le traitement comme auparavant. Ne pas prendre de dose double pour compenser la dose oubliée.**

Posologie usuelle	 lever	 petit déjeuner	 matinée	 midi	 après-midi	 dîner	 coucher	Administration
<b>Combivir®</b>								- Une prise toutes les 12 heures, sans contraintes alimentaires
<b>Crixivan®</b>								- Une prise toutes les 8 heures. Administration à jeun 1 h avant ou 2 h après les repas
<b>Norvir®</b>		 à				 à		- Administration de préférence pendant les repas, en même temps que l'antiprotéase associée.

<b>En pratique</b>	<p><b>Combivir</b> : une baisse importante des globules blancs ou rouges a pu se produire chez certains patients (principalement ceux à un stade avancé de la maladie) sous zidovudine, présente dans Combivir. <b>C'est pourquoi le suivi sanguin est nécessaire tout au long du traitement.</b></p> <p>La survenue d'effets indésirables pourra conduire votre médecin à procéder à un dosage de Crixivan.</p> <p>Les enfants de moins de 12 ans devront prendre séparément les deux molécules (Epivot et Rétrovir) contenues dans Combivir.</p> <p><b>Crixivan</b> : il faut boire au minimum 1,5 litre d'eau par jour, au cours de la journée, pour éviter l'apparition de calculs rénaux.</p> <p>Les capsules molles de Norvir doivent être conservées entre 2 et 8°C, ou 30 jours à température ambiante (25°C).</p>
--------------------	--