
























EPIVIR® +ZERIT® +CRIXIVAN® +NORVIR®

lamivudine (3TC) inhibiteur nucléosidique de la transcriptase inverse (INTI)
 stavudine (d4T) inhibiteur nucléosidique de la transcriptase inverse (INTI)
 indinavir (IDV) inhibiteur de la protéase (IP)
 ritonavir (RTV) inhibiteur de la protéase (IP)

Médicament (taille réelle)	 EPIVIR	 ZERIT	 CRIXIVAN	 NORVIR
Conservation	Température ambiante (< 25°C) à l'abri de la lumière	Température ambiante (< 25°C)	Température ambiante (< 25°C) Conserver les gélules protégées de l'humidité dans le récipient d'origine bien fermé (bouchon dessiccateur)	Entre 2 et 8°C , ou 30 jours à température ambiante (25°C)
Disponibilité	Ville – Hôpital Prescription initiale hospitalière	Ville – Hôpital Prescription initiale hospitalière	Ville – Hôpital Prescription initiale hospitalière	Ville – Hôpital Prescription initiale hospitalière

En cas d'oubli, prendre dès que possible la dose oubliée, puis poursuivre le traitement comme auparavant. Ne pas prendre de dose double pour compenser la dose oubliée.

Posologie usuelle	 lever	 petit déjeuner	 matinée	 midi	 après-midi	 dîner	 coucher	Administration
Epivir®								- Administration sans contraintes alimentaires
Zerit®								- Une prise toutes les 12 heures, sans contraintes alimentaires. - Les gélules contiennent du lactose (attention en cas d'allergie).
Crixivan®								- Une prise toutes les 8 heures. Administration à jeun 1 h avant ou 2 h après les repas
Norvir®		 à 				 à 		- Administration de préférence pendant les repas , en même temps que l'antiprotéase associée.

En pratique	<p>Zerit : vous devez contacter votre médecin si les événements suivants surviennent :</p> <ul style="list-style-type: none"> engourdissement permanent, fourmillements ou douleurs dans les pieds et/ou dans les mains (cela peut indiquer le début d'une neuropathie périphérique, un effet indésirable au niveau des nerfs) douleur abdominale, nausées ou vomissements (ce qui peut indiquer qu'une pancréatite ou un dysfonctionnement hépatique) <p>Crixivan : il faut boire au minimum 1,5 litre d'eau par jour, au cours de la journée, pour éviter l'apparition de calculs rénaux. La survenue d'effets indésirables pourra conduire votre médecin à procéder à un dosage de Crixivan.</p> <p>Les capsules molles de Norvir doivent être conservées entre 2 et 8°C, ou 30 jours à température ambiante (25°C).</p>
--------------------	---