





## EPIVIR® +ZERIT® +INVIRASE® +NORVIR®

lamivudine (3TC) inhibiteur nucléosidique de la transcriptase inverse (INTI)















stavudine (d4T) inhibiteur nucléosidique de la transcriptase inverse (INTI)

saquinavir – hgc (SQV-hgc) inhibiteur de la protéase (IP)

ritonavir (RTV) inhibiteur de la protéase (IP)

Médicament (taille réelle)				
Conservation	Température ambiante (< 25°C) à l'abri de la lumière	Température ambiante (< 25°C)	Température ambiante (< 25°C)	Entre 2 et 8°C, ou 30 jours à température ambiante (25°C)
Disponibilité	Ville – Hôpital Prescription initiale hospitalière	Ville – Hôpital Prescription initiale hospitalière	Ville – Hôpital Prescription initiale hospitalière	Ville – Hôpital Prescription initiale hospitalière

**En cas d'oubli, prendre dès que possible la dose oubliée, puis poursuivre le traitement comme auparavant. Ne pas prendre de dose double pour compenser la dose oubliée.**

Posologie usuelle	 lever	 petit déjeuner	 matinée	 midi	 après-midi	 dîner	 coucher	Administration
EpiVir®								- Administration sans contraintes alimentaires
Zerit®								- Une prise toutes les 12 heures, sans contraintes alimentaires. - Les gélules contiennent du lactose (attention en cas d'allergie).
Invirase®								- En association avec le RTV : Une prise toutes les 12 heures. Toujours <b>aux repas</b> ou dans les 2 heures suivant le repas.
Norvir®		 à				 à		- Administration de <b>préférence pendant les repas</b> , en même temps que l'antiprotéase associée.

En pratique	<p><b>Zerit</b> : vous devez contacter votre médecin si les événements suivants surviennent :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>engourdissement permanent, fourmillements ou douleurs dans les pieds et/ou dans les mains (cela peut indiquer le début d'une neuropathie périphérique, un effet indésirable au niveau des nerfs)</li> </ul> <p><b>douleur abdominale, nausées ou vomissements</b> (ce qui peut indiquer qu'une pancréatite ou un dysfonctionnement hépatique)</p> <p><b>Invirase</b> : les effets indésirables le plus fréquemment rencontrés concernent le tube digestif (diarrhée, gêne abdominale, nausées).</p> <p><b>Les capsules molles de Norvir doivent être conservées entre 2 et 8°C, ou 30 jours à température ambiante (25°C).</b></p>
-------------	---