





















VIDEX® +ZERIT® +AGENERASE® +NORVIR®

didanosine (ddI) inhibiteur nucléosidique de la transcriptase inverse (INTI)
 stavudine (d4T) inhibiteur nucléosidique de la transcriptase inverse (INTI)
 amprénavir (APV) inhibiteur de la protéase (IP)
 ritonavir (RTV) inhibiteur de la protéase (IP)

Médicament (taille réelle)	 VIDEX	 ZERIT	 AGENERASE	 NORVIR
Conservation	Entre 15-25°C dans le flacon d'origine	Température ambiante (< 25°C)	Température ambiante (< 25°C)	Entre 2 et 8°C, ou 30 jours à température ambiante (25°C)
Disponibilité	Ville – Hôpital Prescription initiale hospitalière	Ville – Hôpital Prescription initiale hospitalière	Ville – Hôpital Prescription initiale hospitalière	Ville – Hôpital Prescription initiale hospitalière

**En cas d'oubli, prendre dès que possible la dose oubliée, puis poursuivre le traitement comme auparavant.
 Ne pas prendre de dose double pour compenser la dose oubliée.**

Posologie usuelle	 lever	 petit déjeuner	 matinée	 midi	 après-midi	 dîner	 coucher	Administration
Videx®								- Administration à jeun 2 heures avant ou 2 heures après le repas. A intervalle d'une prise de médicament pouvant interférer avec son absorption.
Zerit®								- Une prise toutes les 12 heures, sans contraintes alimentaires. - Les gélules contiennent du lactose (attention en cas d'allergie).
Agenerase®								Une prise toutes les 12 heures. Administration sans contraintes alimentaires et au moins à 1 heure d'intervalle d'une prise de VIDEX®.
Norvir®								- Administration de préférence pendant les repas , en même temps que l'antiprotéase associée.

En pratique	Avec Videx et Zerit, vous devez contacter votre médecin si les événements suivants surviennent : <ul style="list-style-type: none"> • engourdissement permanent, fourmillements ou douleurs dans les pieds et/ou dans les mains (cela peut indiquer le début d'une neuropathie périphérique, un effet indésirable au niveau des nerfs) • douleur abdominale, nausées ou vomissements (ce qui peut indiquer qu'une pancréatite ou un dysfonctionnement hépatique)
	Videx doit toujours être pris à jeun : le repas peut diminuer son absorption, et donc son efficacité. Eviter les boissons acides (jus de fruit car dégradation rapide du produit) ou gazeuses.
	Agénérase : les effets indésirables le plus fréquemment rencontrés concernent le tube digestif (diarrhée, gêne abdominale, nausées).
	Les capsules molles de Norvir doivent être conservées entre 2 et 8°C, ou 30 jours à température ambiante (25°C). Ne pas co-administrer le ritonavir solution buvable (présence d'alcool) et l'amprénavir solution buvable (présence de propylène glycole).