


















COMBIVIR® + VIREAD® + KALETRA®

zidovudine (ZDV)+ lamivudine (3TC)
 inhibiteur nucléosidique de la transcriptase inverse (INTI)
 ténofovir disoproxil fumarate (TDF) inhibiteur nucléotidique de la transcriptase inverse (INTI)
 lopinavir + ritonavir (LPV/r) inhibiteur de la protéase (IP)

Médicament (taille réelle)	 COMBIVIR	 VIREAD	 KALETRA
Conservation	Température ambiante (< 25°C) à l'abri de la lumière	Température ambiante (< 25°C) dans l'emballage d'origine, à l'abri de l'humidité	Entre 2 et 8°C ou 42 jours à température ambiante (< 25°C)
Disponibilité	Ville – Hôpital Prescription initiale hospitalière	Ville – Hôpital Prescription initiale hospitalière	Ville – Hôpital Prescription initiale hospitalière

En cas d'oubli, prendre dès que possible la dose oubliée, puis poursuivre le traitement comme auparavant. Ne pas prendre de dose double pour compenser la dose oubliée.

Posologie usuelle	 lever	 petit déjeuner	 matinée	 midi	 après-midi	 dîner	 coucher	Administration
Combivir®								- Une prise toutes les 12 heures, sans contraintes alimentaires
Viread®								- Administration au cours d'un repas.
Kaletra®								- Administration au cours des repas ou avec un peu de nourriture.

En pratique	<p>Combivir : une baisse importante des globules blancs ou rouges a pu se produire chez certains patients (principalement ceux à un stade avancé de la maladie) sous zidovudine, présente dans Combivir. C'est pourquoi le suivi sanguin est nécessaire tout au long du traitement.</p> <p>Les enfants de moins de 12 ans devront prendre séparément les deux molécules (Epivir et Rétrovir) contenues dans Combivir.</p> <p>Viread : peut avoir un effet sur vos reins ou diminuer la quantité de phosphate dans le sang. De faibles quantités de phosphate dans le sang pendant de longues périodes peuvent entraîner des anomalies osseuses ainsi que des douleurs osseuses.</p> <p>Kaletra se conserve à une température entre 2 et 8°C ou 42 jours à température ambiante (< 25°C). Ses effets secondaires les plus fréquents sont digestifs (diarrhées).</p>
--------------------	---