














COMBIVIR® + VIRAMUNE®

zidovudine (ZDV)+ lamivudine (3TC)
inhibiteur nucléosidique de la transcriptase inverse (INTI)
 névirapine (NVP) inhibiteur non nucléosidique de la transcriptase inverse (INNTI)

Médicament (taille réelle)	 COMBIVIR	 VIRAMUNE
Conservation	Température ambiante (< 25°C) à l'abri de la lumière	Température ambiante (< 25°C)
Disponibilité	Ville – Hôpital Prescription initiale hospitalière	Ville – Hôpital Prescription initiale hospitalière

**En cas d'oubli, prendre dès que possible la dose oubliée, puis poursuivre le traitement comme auparavant.
 Ne pas prendre de dose double pour compenser la dose oubliée.**

Posologie usuelle	 lever	 petit déjeuner	 matinée	 midi	 après-midi	 dîner	 coucher	Administration
Combivir®								- Une prise toutes les 12 heures, sans contraintes alimentaires
Viramune®								- Administration sans contraintes alimentaires.

En pratique	<p>Combivir : une baisse importante des globules blancs ou rouges a pu se produire chez certains patients (principalement ceux à un stade avancé de la maladie) sous zidovudine, présente dans Combivir. C'est pourquoi le suivi sanguin est nécessaire tout au long du traitement.</p> <p>Les enfants de moins de 12 ans devront prendre séparément les deux molécules (Epivir et Rétrovir) contenues dans Combivir.</p> <p>Viramune : Il est très important de respecter la prescription : vous prendrez d'abord 200 mg (un comprimé) de Viramune par jour. Puis, en l'absence d'éruption cutanée, la posologie sera portée à 200 mg deux fois par jour à partir du quatorzième jour.</p> <p>Les deux premiers mois de votre traitement nécessitent une surveillance étroite, afin de mettre en évidence la survenue réactions allergiques (peuvent prendre la forme d'une éruption cutanée, accompagnée d'autres effets indésirables : fièvre, formation de cloques sur la peau, plaies dans la bouche, inflammation des yeux, gonflement du visage, œdème, douleurs musculaires ou articulaires, malaise général ainsi que d'autres signes hématologiques, rénaux ou hépatiques) ou d'une hépatite grave (symptômes pouvant évoquer une hépatite : perte d'appétit, nausées, vomissements ou jaunisse) pouvant mettre votre vie en danger.</p> <p>Si vous présentez un de ces effets indésirables, vous devez contacter votre médecin immédiatement.</p>
-------------	--