
















EPIVIR® + VIREAD® + SUSTIVA®

lamivudine (3TC)
inhibiteur nucléosidique de la transcriptase inverse (INTI)
ténofovir disoproxil fumarate (TDF) inhibiteur nucléotidique de la transcriptase inverse (INtTI)
éfavirenz (EFV) inhibiteur non nucléosidique de la transcriptase inverse (INNTI)

Médicament (taille réelle)	 EPIVIR	 VIREAD	 SUSTIVA
Conservation	15-25°C dans le flacon d'origine	Température ambiante (< 25°C) dans l'emballage d'origine, à l'abri de l'humidité	Température ambiante (< 25°C)
Disponibilité	Ville – Hôpital Prescription initiale hospitalière	Ville – Hôpital Prescription initiale hospitalière	Ville – Hôpital Prescription initiale hospitalière

En cas d'oubli, prendre dès que possible la dose oubliée, puis poursuivre le traitement comme auparavant. Ne pas prendre de dose double pour compenser la dose oubliée.

Posologie usuelle	 lever	 petit déjeuner	 matinée	 midi	 après-midi	 dîner	 coucher	Administration
Epivir®								- Administration sans contraintes alimentaires
Viread®								- Administration au cours d'un repas.
Sustiva®								- Administration de préférence le soir au coucher , avec ou sans aliments - Prudence chez les utilisateurs de machines et les conducteurs

En pratique	<p>Viread : peut avoir un effet sur vos reins ou diminuer la quantité de phosphate dans le sang. De faibles quantités de phosphate dans le sang pendant de longues périodes peuvent entraîner des anomalies osseuses ainsi que des douleurs osseuses.</p> <p>Sustiva est contre-indiqué chez la femme enceinte. Des symptômes affectant le système nerveux (sensations vertigineuses, insomnies, somnolence, problèmes de concentration et cauchemars) peuvent apparaître dès le premier jour de traitement. Ils ont tendance à disparaître chez la grande majorité des patients en quelques semaines, mais peuvent se prolonger au-delà.</p> <p>Des symptômes plus sévères (troubles de l'humeur, idées suicidaires, comportement coléreux) peuvent également survenir. Contacter votre médecin si vous ressentez de tels symptômes.</p>
-------------	---