

















EPIVIR® + VIREAD® + VIRAMUNE®

lamivudine (3TC)
 inhibiteur nucléosidique de la transcriptase inverse (INTI)
 ténofovir disoproxil fumarate (TDF) inhibiteur nucléotidique de la transcriptase inverse (INtTI)
 névirapine (NVP) inhibiteur non nucléosidique de la transcriptase inverse (INNTI)

Médicament (taille réelle)	 EPIVIR	 VIREAD	 VIRAMUNE
Conservation	15-25°C dans le flacon d'origine	Température ambiante (< 25°C) dans l'emballage d'origine, à l'abri de l'humidité	Température ambiante (< 25°C)
Disponibilité	Ville – Hôpital Prescription initiale hospitalière	Ville – Hôpital Prescription initiale hospitalière	Ville – Hôpital Prescription initiale hospitalière

En cas d'oubli, prendre dès que possible la dose oubliée, puis poursuivre le traitement comme auparavant. Ne pas prendre de dose double pour compenser la dose oubliée.

Posologie usuelle	 lever	 petit déjeuner	 matinée	 midi	 après-midi	 dîner	 coucher	Administration
Epivir®								- Administration sans contraintes alimentaires
Viread®								- Administration au cours d'un repas.
Viramune®								- Administration sans contraintes alimentaires

En pratique	<p>Viread : peut avoir un effet sur vos reins ou diminuer la quantité de phosphate dans le sang. De faibles quantités de phosphate dans le sang pendant de longues périodes peuvent entraîner des anomalies osseuses ainsi que des douleurs osseuses.</p> <p>Viramune : Il est très important de respecter la prescription : vous prendrez d'abord 200 mg (un comprimé) de Viramune par jour. Puis, en l'absence d'éruption cutanée, la posologie sera portée à 200 mg deux fois par jour à partir du quatorzième jour.</p> <p>Les deux premiers mois de votre traitement nécessitent une surveillance étroite, afin de mettre en évidence la survenue réactions allergiques (peuvent prendre la forme d'une éruption cutanée, accompagnée d'autres effets indésirables : fièvre, formation de cloques sur la peau, plaies dans la bouche, inflammation des yeux, gonflement du visage, œdème, douleurs musculaires ou articulaires, malaise général ainsi que d'autres signes hématologiques, rénaux ou hépatiques) ou d'une hépatite grave (symptômes pouvant évoquer une hépatite : perte d'appétit, nausées, vomissements ou jaunisse) pouvant mettre votre vie en danger.</p> <p>Si vous présentez un de ces effets indésirables, vous devez contacter votre médecin immédiatement.</p>
--------------------	--