

















# EPIVIR® + VIREAD® + VIRACEPT®

lamivudine (3TC)  
 inhibiteur nucléosidique de la transcriptase inverse (INTI)  
 ténofovir disoproxil fumarate (TDF) inhibiteur nucléotidique de la transcriptase inverse (INtTI)  
 nelfinavir (NFV) inhibiteur de la protéase (IP)

Médicament (taille réelle)	 <b>EPIVIR</b>	 <b>VIREAD</b>	 <b>VIRACEPT</b>
<b>Conservation</b>	15-25°C dans le flacon d'origine	Température ambiante (< 25°C) dans l'emballage d'origine, à l'abri de l'humidité	Température ambiante (< 25°C)
<b>Disponibilité</b>	Ville – Hôpital Prescription initiale hospitalière	Ville – Hôpital Prescription initiale hospitalière	Ville – Hôpital Prescription initiale hospitalière

**En cas d'oubli, prendre dès que possible la dose oubliée, puis poursuivre le traitement comme auparavant. Ne pas prendre de dose double pour compenser la dose oubliée.**

Posologie usuelle	 lever	 petit déjeuner	 matinée	 midi	 après-midi	 dîner	 coucher	Administration
<b>Epivir®</b>								- Administration sans contraintes alimentaires
<b>Viread®</b>								- Administration <b>au cours d'un repas.</b>
<b>Viracept®</b>								- Administration <b>au cours des repas</b>

<b>En pratique</b>	<p><b>Viread</b> : peut avoir un effet sur vos reins ou diminuer la quantité de phosphate dans le sang. De faibles quantités de phosphate dans le sang pendant de longues périodes peuvent entraîner des anomalies osseuses ainsi que des douleurs osseuses.</p> <p><b>Viracept</b> : l'effet indésirable le plus fréquent est la survenue de diarrhées. On peut aussi le prendre trois fois par jour (matin, midi et soir), pendant les repas, à raison de 3 comprimés par prise.</p>
--------------------	--