


















EPIVIR® + ZIAGEN® + VIRAMUNE®

lamivudine (3TC)
 inhibiteur nucléosidique de la transcriptase inverse (INTI)
 abacavir (ABC) inhibiteur nucléosidique de la transcriptase inverse (INTI)
 névirapine (NVP) inhibiteur non nucléosidique de la transcriptase inverse (INNTI)

| Médicament (taille réelle) |  EPIVIR |  ZIAGEN |  VIRAMUNE |
|-------------------------------|---|---|---|
| Conservation | 15-25°C dans le flacon d'origine | Température ambiante (< 25°C) | Température ambiante (< 25°C) |
| Disponibilité | Ville – Hôpital Prescription initiale hospitalière | Ville – Hôpital Prescription initiale hospitalière | Ville – Hôpital Prescription initiale hospitalière |

**En cas d'oubli, prendre dès que possible la dose oubliée, puis poursuivre le traitement comme auparavant.
 Ne pas prendre de dose double pour compenser la dose oubliée.**

| Posologie usuelle |  lever |  petit déjeuner |  matinée |  midi |  après-midi |  dîner |  coucher | Administration |
|-------------------|---|--|---|--|--|---|---|---|
| Epivir® | | | | | |  | | - Administration sans contraintes alimentaires |
| Ziagen® | |  | | | |  | | - Une prise toutes les 12 heures, sans contraintes alimentaires |
| Viramune® | |  | | | |  | | - Administration sans contraintes alimentaires |

| | |
|--------------------|---|
| En pratique | <p>Ziagen : (voir fiche produit)</p> <p>Les patients prenant Ziagen peuvent développer une réaction allergique grave nécessitant l'arrêt définitif du traitement. Conservez sur vous en permanence la carte de mise en garde incluse dans la boîte de Ziagen</p> <p>Si vous avez arrêté Ziagen en raison d'une réaction d'hypersensibilité, vous ne devez jamais reprendre Ziagen: cela peut entraîner en quelques heures une mise en jeu du pronostic vital (avec hypotension artérielle), voire le décès.</p> <p>Viramune : Il est très important de respecter la prescription : vous prendrez d'abord 200 mg (un comprimé) de Viramune par jour. Puis, en l'absence d'éruption cutanée, la posologie sera portée à 200 mg deux fois par jour à partir du quatorzième jour.</p> <p>Les deux premiers mois de votre traitement nécessitent une surveillance étroite, afin de mettre en évidence la survenue réactions allergiques (peuvent prendre la forme d'une éruption cutanée, accompagnée d'autres effets indésirables : fièvre, formation de cloques sur la peau, plaies dans la bouche, inflammation des yeux, gonflement du visage, œdème, douleurs musculaires ou articulaires, malaise général ainsi que d'autres signes hématologiques, rénaux ou hépatiques) ou d'une hépatite grave (symptômes pouvant évoquer une hépatite : perte d'appétit, nausées, vomissements ou jaunisse) pouvant mettre votre vie en danger.</p> <p>Si vous présentez un de ces effets indésirables, vous devez contacter votre médecin immédiatement.</p> |
|--------------------|---|