

EPIVIR® +VIREAD® +REYATAZ® +NORVIR®





lamivudine (3TC)

inhibiteur nucléosidique de la transcriptase inverse (INTI)













ténofovir disoproxil fumarate (TDF) inhibiteur nucléotidique de la transcriptase inverse (INTI)

atazanavir (ATV) - inhibiteur de la protéase (IP)

ritonavir (RTV) inhibiteur de la protéase (IP)

Médicament (taille réelle)	 EPIVIR	 VIREAD	 REYATAZ	 NORVIR
Conservation	Température ambiante (< 25°C) à l'abri de la lumière	Température ambiante (< 25°C) dans l'emballage d'origine, à l'abri de l'humidité	- Température ambiante (15-25°C) dans l'emballage d'origine.	Entre 2 et 8°C , ou 30 jours à température ambiante (25°C)
Disponibilité	Ville – Hôpital Prescription initiale hospitalière	Ville – Hôpital Prescription initiale hospitalière	Hôpital Prescription initiale hospitalière	Ville – Hôpital Prescription initiale hospitalière

En cas d'oubli, prendre dès que possible la dose oubliée, puis poursuivre le traitement comme auparavant. Ne pas prendre de dose double pour compenser la dose oubliée.

Posologie usuelle	 lever	 petit déjeuner	 matinée	 midi	 après-midi	 dîner	 coucher	Administration
Epivir®								- Administration sans contraintes alimentaires
Viread®								- Administration au cours d'un repas.
Reyataz®								- Administration au cours des repas.
Norvir®		 à				 à		- Administration de préférence pendant les repas , en même temps que l'antiprotéase associée.

En pratique	<p>Viread : peut avoir un effet sur vos reins ou diminuer la quantité de phosphate dans le sang. De faibles quantités de phosphate dans le sang pendant de longues périodes peuvent entraîner des anomalies osseuses ainsi que des douleurs osseuses.</p> <p>Reyataz : Ne doit être administré qu'avec de faibles doses de ritonavir (NORVIR®). Effets indésirables classiques des IP absents à court terme mais inconnus à long terme</p> <p>Les capsules molles de Norvir doivent être conservées entre 2 et 8°C, ou 30 jours à température ambiante (25°C).</p>
--------------------	---