


















ZIAGEN® + VIREAD® + KALETRA®

abacavir (ABC) inhibiteur nucléosidique de la transcriptase inverse (INTI)
ténofovir disoproxil fumarate (TDF) inhibiteur nucléotidique de la transcriptase inverse (INtTI)
lopinavir + ritonavir (LPV/r) inhibiteur de la protéase (IP)

Médicament (taille réelle)	 ZIAGEN	 VIREAD	 KALETRA
Conservation	Température ambiante (< 25°C)	Température ambiante (< 25°C) dans l'emballage d'origine, à l'abri de l'humidité	Entre 2 et 8°C ou 42 jours à température ambiante (< 25°C)
Disponibilité	Ville – Hôpital Prescription initiale hospitalière	Ville – Hôpital Prescription initiale hospitalière	Ville – Hôpital Prescription initiale hospitalière

En cas d'oubli, prendre dès que possible la dose oubliée, puis poursuivre le traitement comme auparavant. Ne pas prendre de dose double pour compenser la dose oubliée.

Posologie usuelle	 lever	 petit déjeuner	 matinée	 midi	 après-midi	 dîner	 coucher	Administration
Ziagen®								- Une prise toutes les 12 heures, sans contraintes alimentaires
Viread®								- Administration au cours d'un repas.
Kaletra®								- Administration au cours des repas ou avec un peu de nourriture.

	<p>Ziagen : (voir fiche produit)</p> <p>Les patients prenant Ziagen peuvent développer une réaction allergique grave nécessitant l'arrêt définitif du traitement. Conservez sur vous en permanence la carte de mise en garde incluse dans la boîte de Ziagen</p> <p>Si vous avez arrêté Ziagen en raison d'une réaction d'hypersensibilité, vous ne devez jamais reprendre Ziagen: cela peut entraîner en quelques heures une mise en jeu du pronostic vital (avec hypotension artérielle), voire le décès.</p>
En pratique	<p>Viread : peut avoir un effet sur vos reins ou diminuer la quantité de phosphate dans le sang. De faibles quantités de phosphate dans le sang pendant de longues périodes peuvent entraîner des anomalies osseuses ainsi que des douleurs osseuses.</p> <p>Kaletra se conserve à une température entre 2 et 8°C ou 42 jours à température ambiante (< 25°C). Ses effets secondaires les plus fréquents sont digestifs (diarrhées).</p>