




VIDEX® + VIREAD® + SUSTIVA®

didanosine (ddI) inhibiteur nucléosidique de la transcriptase inverse (INTI)
ténofovir disoproxil fumarate (TDF) inhibiteur nucléotidique de la transcriptase inverse (INtTI)
éfavirenz (EFV) inhibiteur non nucléosidique de la transcriptase inverse (INNTI)











Médicament (taille réelle)	 VIDEX	 VIREAD	 SUSTIVA
Conservation	15-25°C dans le flacon d'origine	Température ambiante (< 25°C) dans l'emballage d'origine, à l'abri de l'humidité	Température ambiante (< 25°C)
Disponibilité	Ville – Hôpital Prescription initiale hospitalière	Ville – Hôpital Prescription initiale hospitalière	Ville – Hôpital Prescription initiale hospitalière

SELON LES RECOMMANDATIONS DE L'EMEA (MARS 2005), L'ADMINISTRATION CONCOMITANTE DU VIDEX ET DU VIREAD N'EST PAS RECOMMANDÉE, EN PARTICULIER CHEZ LES PATIENTS PRÉSENTANT UNE CHARGE VIRALE ÉLEVÉE ET UN TAUX DE CD4 BAS.

SI CETTE ASSOCIATION EST ESTIMÉE ABSOLUMENT NÉCESSAIRE, LES PATIENTS DEVRONT ÊTRE ATTENTIVEMENT SURVEILLÉS AU PLAN DE L'EFFICACITÉ ET DE LA TOLÉRANCE (APPARITION D'EFFETS INDESIRABLES LIÉS AU VIDEX)

En cas d'oubli, prendre dès que possible la dose oubliée, puis poursuivre le traitement comme auparavant.

Ne pas prendre de dose double pour compenser la dose oubliée.

Posologie usuelle	 lever	 petit déjeuner	 matinée	 midi	 après-midi	 dîner	 coucher	Administration
Videx®								- Administration à jeun 2 heures avant ou 2 heures après le repas. A intervalle d'une prise de médicament pouvant interférer avec son absorption.
Viread®								- Administration au cours d'un repas à distance du Videx (12h)
Sustiva®								Administration de préférence le soir au coucher , avec ou sans aliments Prudence chez les utilisateurs de machines et les conducteurs

En pratique	<p>Avec Videx, vous devez contacter votre médecin si les événements suivants surviennent : engourdissement permanent, fourmillements ou douleurs dans les pieds et/ou dans les mains (cela peut indiquer le début d'une neuropathie périphérique, un effet indésirable au niveau des nerfs) douleur abdominale, nausées ou vomissements (ce qui peut indiquer qu'une pancréatite ou un dysfonctionnement hépatique) Videx doit toujours être pris à jeun : le repas peut diminuer son absorption, et donc son efficacité. Éviter les boissons acides (jus de fruit car dégradation rapide du produit) ou gazeuses.</p> <p>Viread : peut avoir un effet sur vos reins ou diminuer la quantité de phosphate dans le sang. De faibles quantités de phosphate dans le sang pendant de longues périodes peuvent entraîner des anomalies osseuses ainsi que des douleurs osseuses. Prendre à distance du Videx.</p> <p>Sustiva est contre-indiqué chez la femme enceinte. Des symptômes affectant le système nerveux (sensations vertigineuses, insomnies, somnolence, problèmes de concentration et cauchemars) peuvent apparaître dès le premier jour de traitement. Ils ont tendance à disparaître chez la grande majorité des patients en quelques semaines, mais peuvent se prolonger au-delà.</p>
-------------	---