













**VIREAD® + KALETRA®**

**ténofovir disoproxil fumarate (TDF) inhibiteur nucléotidique de la transcriptase inverse (INTI)**  
**lopinavir + ritonavir (LPV/r) inhibiteur de la protéase (IP)**

Médicament (taille réelle)	 <b>VIREAD</b>	 <b>KALETRA</b>
Conservation	Température ambiante (< 25°C) dans l'emballage d'origine, à l'abri de l'humidité	Entre 2 et 8°C ou 42 jours à température ambiante (< 25°C)
Disponibilité	Ville – Hôpital Prescription initiale hospitalière	Ville – Hôpital Prescription initiale hospitalière

**En cas d'oubli, prendre dès que possible la dose oubliée, puis poursuivre le traitement comme auparavant.  
 Ne pas prendre de dose double pour compenser la dose oubliée.**

Posologie usuelle	 lever	 petit déjeuner	 matinée	 midi	 après-midi	 dîner	 coucher	Administration
Viread®								- Administration <b>au cours d'un repas.</b>
Kaletra®								- Administration au cours des repas ou avec un peu de nourriture.

En pratique	<p><b>Viread</b> : peut avoir un effet sur vos reins ou diminuer la quantité de phosphate dans le sang. De faibles quantités de phosphate dans le sang pendant de longues périodes peuvent entraîner des anomalies osseuses ainsi que des douleurs osseuses.</p> <p><b>Kaletra</b> se conserve à une température entre 2 et 8°C ou 42 jours à température ambiante (&lt; 25°C). Ses effets secondaires les plus fréquents sont digestifs (diarrhées).</p>
-------------	---