















RETROVIR®

zidovudine (ZDV) inhibiteur nucléosidique de la transcriptase inverse (INTI)

Médicament (taille réelle)	100 mg 	250 mg 	300 mg 
Formes galéniques	- Gélule à 100 mg (blanche à bande bleu foncé) — Étui de 100, sous plaquette thermoformée (PVC/ALU). - Gélule à 250 mg (blanc et bleu à bande bleu foncé) — Étui de 40, sous plaquette thermoformée (PVC/ALU). - Comprimé pelliculé à 300 mg (ivoire) — Étui de 60, sous plaquettes thermoformées (PVC/ALU). - Solution buvable à 10 mg/ml arôme fraise — flacon (verre brun) de 200 ml, avec mesurette graduée 10 ml - Solution injectable à 200mg/20ml pour perfusion IV — flacons (verre brun) de 20 ml, étui de 5.		
Conservation	- Formes orales : température ambiante (< 25°C). - Perfusion : 4 heures (stabilité physico-chimique) entre 5 et 25°C		

En cas d'oubli, prendre dès que possible la dose oubliée, puis poursuivre le traitement comme auparavant. Ne pas prendre de dose double pour compenser la dose oubliée.

Posologie usuelle	 lever	 petit déjeuner	 matinée	 midi	 après-midi	 dîner	 coucher	Administration
Adultes et adolescents 250 à 300 mg x 2/j		 ou 				 ou 		- administration sans contraintes alimentaires
Enfants 120 à 160 mg/m ² x 3/j		prise		prise		prise		- administration sans contraintes alimentaires

Voie injectable : dilution de la solution injectable dans une solution de glucose à 5% et administration par I.V lente en 1 heure minimum

Contre-indications	- Hypersensibilité connue à la zidovudine ou à l'un des excipients de la spécialité. - Troubles hématologiques sévères (taux d'hémoglobine < 7,5 g/dl soit 4,65 mmol/l, ou neutrophiles < 0,75 x 10 ⁹ /l). - Nouveau-né ayant une hyperbilirubinémie nécessitant un traitement autre que la photothérapie ou ayant des taux de transaminases de plus de 5 fois la limite supérieure de la normale.
Interactions médicamenteuses cliniquement significatives (selon le GTIAM)	* association déconseillée : ribavirine, stavudine * précaution d'emploi : amphotéricine B, carbamazépine, dapsonne, flucytosine, phosphénytoïne, ganciclovir, griséofulvine, phénobarbital, phénytoïne, primidone, pyriméthamine, rifampicine
Principaux effets indésirables	- Effets communs INTI : nausées, vomissements, toxicité mitochondriale (acidose lactique et hépatomégalie avec stéatose hépatique, rare mais potentiellement mortel) - Anémie, neutropénie, leucopénie - Intolérance gastro-intestinale, céphalées, insomnie, asthénie - Cytopathie mitochondriale chez les nouveau-nés dont la mère a reçu l'association ZDV/3TC
En pratique	Pour les patients qui tolèrent mal le produit, on recommande de fractionner la posologie en prise de 100mg (soit 6 prises/ jours).