





SUSTIVA®

éfavirenz (EFV) inhibiteur non nucléosidique de la transcriptase inverse (INNTI)

Médicament (taille réelle)	   
Formes galéniques	- Gélule à 50 mg (flacon de 30); à 100 mg (flacon de 30) ; à 200 mg (flacon de 90) - Comprimé à 600 mg (boîte de 30) - Solution buvable 30 mg/ml — flacon de 100 ml. ATU nominative.
Conservation	- Température ambiante (< 25°C)

En cas d'oubli, prendre dès que possible la dose oubliée, puis poursuivre le traitement comme auparavant. Ne pas prendre de dose double pour compenser la dose oubliée.

Posologie usuelle	lever	petit déjeuner	matinée	midi	après-midi	dîner	coucher	Administration
Adultes et adolescents 600 mg x 1/j								- Administration de préférence le soir au coucher , avec ou sans aliments - Prudence chez les utilisateurs de machines et les conducteurs
Enfants 200 à 400 mg x 1/j selon le poids (< 40 kg)							1 à 2 gélules ou 7 à 13 ml de solution	

Contre-indications	- Hypersensibilité connue à l'éfavirenz ou à l'un des excipients de la spécialité - Insuffisance hépatique sévère - Grossesse
Interactions médicamenteuses cliniquement significatives (selon le GTIAM)	* contre indication : broparestrol, chlormadinone, chlorotrianisene, démégestone, désogestrel, diénestrol, diéthylstilbestrol, dydrogestérone, estradiol, estriol, oestrogènes, estrone, éthinyloestradiol, étonogestrel, etynodiol, fosfestrol, gestodene, gestonorone, hydroxyestrone, hydroxyprogestérone, lévonorgestrel, lynestrérol, medrogestone, medroxyprogestérone, megestrol, moxestrol, nomegestrol, norethistérone, norgestimate, norgestrel, norgestriénone, progestérone, promegestone, promestriène, saquinavir * précaution d'emploi : ciclosporine, clozapine, indinavir, méthadone, rifampicine, tacrolimus
Principaux effets indésirables	- Sensations vertigineuses, insomnie, somnolence, troubles de la concentration et perturbation des rêves, nausées, céphalées et fatigue. Ces signes disparaissent souvent en 2 à 4 semaines. - Éruptions cutanées - Réactions allergiques, coordination anormale, ataxie, confusion - Augmentation des ASAT, ALAT, gamma-GT, amylase sérique, cholestérol total - faux positifs aux tests pour les cannabinoïdes Chez les enfants , effets indésirables généralement similaires à ceux des adultes, mais éruptions cutanées plus fréquentes et souvent plus sévères, et symptômes affectant le système nerveux apparemment moins fréquents et généralement modérés.
En pratique	Sustiva est contre-indiqué chez la femme enceinte. Des symptômes affectant le système nerveux (sensations vertigineuses, insomnies, somnolence, problèmes de concentration et cauchemars) peuvent apparaître dès le premier jour de traitement. Ils ont tendance à disparaître chez la grande majorité des patients en quelques semaines, mais peuvent se prolonger au-delà. Le fractionnement de la prise entre le matin et le soir n'a pas d'effet sur la survenue, l'intensité et la durée des effets indésirables. Des symptômes plus sévères (troubles de l'humeur, idées suicidaires, comportement coléreux) peuvent également survenir. Contacter votre médecin si vous ressentez de tels symptômes.