
















**VIRACEPT®**
**nelfinavir (NFV) - inhibiteur de la protéase (IP)**

Médicament (taille réelle)	
Formes galéniques	- Comprimé pelliculé à 250 mg — flacon de 300. - Poudre orale à 50 mg/g arôme orange — flacon de 144 g de poudre + cuillères-mesure de 1 g (blanche) et de 5 g (bleue).
Conservation	- Température ambiante (< 25°C). - La poudre se conserve 6 heures après reconstitution.

**En cas d'oubli, prendre dès que possible la dose oubliée, puis poursuivre le traitement comme auparavant. Ne pas prendre de dose double pour compenser la dose oubliée.**

Posologie usuelle	 lever	 petit déjeuner	 matinée	 midi	 après-midi	 dîner	 coucher	Administration
<b>Adultes et adolescents</b> 1250 mg x 2/j								- Administration <b>au cours des repas.</b>
<b>ou</b> 750 mg x 3/j								- Administration au cours des repas.
<b>Enfants</b> 25 à 30 mg/kg x 3/j		prise		prise		prise		- Ne pas ajouter de liquide dans les flacons. La poudre est à mélanger avec de l'eau ou du lait mais pas avec des boissons acides (jus de fruits) en raison du goût.
<b>associé à NORVIR®</b> <b>Adultes et adolescents</b> 500 à 750 mg x 2/j								- Administration au cours des repas.

<b>Contre-indications</b>	- Hypersensibilité connue au nelfinavir ou à l'un des excipients de la spécialité
<b>Interactions médicamenteuses cliniquement significatives (selon le GTIAM)</b>	* <b>contre indication</b> : astémizole, atorvastatine, bépridil, cérvastatine, cisapride, démégestone, désogestrel, dihydroergotamine, ergotamine, éthinylestradiol, étonogestrel, gestonorone, halofantrine, lévonorgestrel, lynestrérol, medroxyprogestérone, millepertuis, mizolastine, norethistérone, norgestimate, norgestrel, norgestrionone, pimozide, rifampicine, simvastatine, terfénadine * <b>association déconseillée</b> : toltérodine * <b>précaution d'emploi</b> : carbamazépine, ciclosporine, méthadone, midazolam, phénobarbital, phénytoïne, primidone, rifabutine, sildénafil, tacrolimus, triazolam
<b>Principaux effets indésirables</b>	- Effets communs des IP : <b>Lipodystrophie</b> (redistribution de la masse grasse corporelle, diminution de la graisse périphérique sous-cutanée, augmentation de la graisse intra-abdominale, hypertrophie mammaire, accumulation de graisse rétrocervicale); <b>Anomalies du métabolisme glucidolipidique</b> (hypertriglycéridémie, hypercholestérolémie, résistance à l'insuline et hyperglycémie, apparition ou aggravation d'un diabète); <b>Troubles musculaires</b> (augmentation des CPK, myalgie, myosite, rhabdomyolyse); <b>Augmentation des saignements spontanés</b> chez le patient hémophile; <b>Troubles gastro-intestinaux</b> (nausée, diarrhée, flatulence, vomissement, douleur abdominale, dyspepsie) - Diarrhée : effet indésirable le plus fréquent, contrôlable par des ralentisseurs du transit - Intolérance au glucose, diabète - Flatulences, nausées, éruptions cutanées
<b>En pratique</b>	La survenue de diarrhées correspond à l'effet indésirable le plus fréquent avec Viracept. On peut aussi prendre Viracept trois fois par jour, matin, midi et soir, avec les repas, à raison de trois comprimés par prise.