










VIREAD®

ténofovir disoproxil fumarate (TDF)
inhibiteur nucléotidique de la transcriptase inverse (INtTI)

Médicament (taille réelle)	
Formes galéniques	- Comprimé pelliculé à 300 mg — flacon (PEHD) de 30
Conservation	- Température ambiante (< 25°C) dans l'emballage d'origine, à l'abri de l'humidité

En cas d'oubli, prendre dès que possible la dose oubliée, puis poursuivre le traitement comme auparavant. Ne pas prendre de dose double pour compenser la dose oubliée.

Posologie usuelle	 lever	 petit déjeuner	 matinée	 midi	 après-midi	 dîner	 coucher	Administration
Adultes et adolescents 300 mg x 1/j								- Administration au cours d'un repas.
Enfants Non déterminée	-	-	-	-	-	-	-	

Contre-indications	- Hypersensibilité connue au ténofovir DF ou à l'un des excipients de la spécialité
Interactions médicamenteuses cliniquement significatives (selon le GTIAM)	* association déconseillée : médicaments néphrotoxiques
Principaux effets indésirables	- Asthénie, céphalée, diarrhée, douleur abdominale, éruption cutanée, gastralgie, insuffisance rénale chronique, nausée vomissement, pharyngite - Augmentation des ASAT, hypercréatininémie, hyperglycémie, hypertriglycéridémie, hypophosphatémie, neutropénie, protéinurie
En pratique	Viread doit être utilisé avec précaution chez les patients souffrant d'insuffisance rénale modérée. Si insuffisance sévère, l'intervalle entre les administrations devra être adapté. La tolérance au long cours, notamment au niveau rénal, doit être surveillée. Viread peut avoir un effet sur vos reins ou diminuer la quantité de phosphate dans le sang. De faibles quantités de phosphate dans le sang pendant de longues périodes peuvent entraîner des anomalies osseuses ainsi que des douleurs osseuses.