
















ZERIT®

stavudine (d4T) inhibiteur nucléosidique de la transcriptase inverse (INTI)

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Médicament (taille réelle) | 15 mg  | 20 mg  | 30 mg  | 40 mg  |
| Formes galéniques | - Gélule à 15 mg (rouge et jaune), 20 mg (brun), 30 mg (orange clair et foncé), 40 mg (orange foncé) — boîtes de 56, sous plaquettes thermoformées (Aclar/ALU) de 14. - Poudre pour solution buvable à reconstituer (1 mg/ml) arôme cerise — flacon (PE) à 200 mg avec cuillère-mesure. | | | |
| Conservation | - Température ambiante (< 25°C). - Poudre pour solution buvable : 2 mois après ouverture | | | |

En cas d'oubli, prendre dès que possible la dose oubliée, puis poursuivre le traitement comme auparavant. Ne pas prendre de dose double pour compenser la dose oubliée.

| Posologie usuelle |  lever |  petit déjeuner |  matinée |  midi |  après-midi |  dîner |  coucher | Administration |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adultes et adolescents > 60 kg : 40 mg x 2/j < 60 kg : 30 mg x 2/j posologie selon CL.creat chez l'insuffisant rénal | |  ou  | | | |  ou  | | - Une prise toutes les 12 heures, sans contraintes alimentaires. - Les gélules contiennent du lactose (attention en cas d'allergie). |
| Enfants 1 mg/kg x 2/j (< 30 kg) | | prise | | | | prise | | - Après reconstitution, la solution contient 50 mg de saccharose / ml. |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contre-indications | - Hypersensibilité connue à la stavudine ou à l'un des excipients de la spécialité |
| Interactions médicamenteuses cliniquement significatives (selon le GTIAM) | * association déconseillée : zalcitabine, zidovudine * précaution d'emploi : isoniazide, pentamidine, thalidomide. |
| Principaux effets indésirables | - Effets communs INTI : nausées, vomissements, toxicité mitochondriale (acidose lactique et hépatomégalie avec stéatose hépatique, rare mais potentiellement mortel) - Neuropathie périphérique - Pancréatite |
| En pratique | Vous devez contacter votre médecin si les événements suivants surviennent : <ul style="list-style-type: none"> engourdissement permanent, fourmillements ou douleurs dans les pieds et/ou dans les mains (cela peut indiquer le début d'une neuropathie périphérique, un effet indésirable au niveau des nerfs) ou douleur abdominale, nausées ou vomissements (ce qui peut indiquer une pancréatite ou un dysfonctionnement hépatique) |