












**ZIAGEN®**
**abacavir (ABC) inhibiteur nucléosidique de la transcriptase inverse (INTI)**

Médicament (taille réelle)	
Formes galéniques	- Comprimé pelliculé à 300 mg (jaune) — étui de 60, sous plaquettes thermoformées (chlorure de polyvinyle/ALU). - Solution buvable à 20 mg/ml arôme <b>fraise</b> - banane (aqueuse ; jaune clair à légèrement opalescente) — flacon (PEHD) de 240 ml (avec pipette doseuse graduée de 10 ml avec adaptateur).
Conservation	- Température ambiante (< 25°C). - Solution buvable : < 25°C. Ne pas conserver plus de 2 mois après ouverture

**En cas d'oubli, prendre dès que possible la dose oubliée, puis poursuivre le traitement comme auparavant. Ne pas prendre de dose double pour compenser la dose oubliée.**

Posologie usuelle	 lever	 petit déjeuner	 matinée	 midi	 après-midi	 dîner	 coucher	Administration
Adultes et adolescents 300 mg x 2/j								- Une prise toutes les 12 heures, sans contraintes alimentaires
Adultes et adolescents 600 mg x 1/j								- Une prise par jour, le matin OU le soir, sans contraintes alimentaires
Enfants 8 mg/kg x 2/j		prise				prise		- La solution buvable contient du sorbitol et du propylène glycol

Contre-indications	- Hypersensibilité connue à l'abacavir ou à l'un des excipients de la spécialité - Insuffisance hépatique sévère
Interactions médicamenteuses cliniquement significatives (selon le GTIAM)	* inducteurs enzymatiques puissants tels que rifampicine, phénobarbital, phénytoïne * éthanol, méthadone, rétinoïdes
Principaux effets indésirables	- Effets communs INTI : nausées, vomissements, <b>toxicité mitochondriale</b> (acidose lactique et hépatomégalie avec stéatose hépatique, rare mais potentiellement mortel) - <b>Hypersensibilité</b> (3 à 5%) : fièvre, malaise, rash, intolérances gastro-intestinale, respiratoire. Signes disparaissant dans les 2 jours après arrêt du traitement. <b>Ne pas réintroduire</b> (risque de reprise et aggravation des symptômes dans les heures suivantes, avec hypotension sévère mettant en jeu le pronostic vital) - Réadministration prudente si arrêt pour autre cause qu'hypersensibilité
En pratique	<b>L'administration en 1 prise par jour ne concerne que l'adulte et l'adolescent.</b> <i>Pour passer de 2 prises/j à 1 prise unique le matin</i> : la veille 300 mg matin et 300 mg le soir, puis le lendemain matin, 600 mg <i>Pour passer de 2 prises/j à 1 prise unique le soir</i> : le matin, prendre 300 mg, puis le soir, 600 mg et ensuite tous les soirs 600 mg Une <b>carte de mise en garde</b> est incluse dans la boîte de Ziagen pour vous rappeler, ainsi qu'à l'équipe médicale, le risque d'hypersensibilité à Ziagen. Vous devez la détacher, la compléter et la conserver sur vous en permanence. Si vous présentez une éruption cutanée ou des symptômes appartenant à au moins deux des catégories suivantes (fièvre; essoufflement, maux de gorge ou toux; nausées, vomissements, diarrhée ou douleurs abdominales; fatigue, courbatures sévères ou sensation de malaise général), <b>appelez immédiatement votre médecin</b> , qui vous dira si vous devez arrêter de prendre Ziagen. Si vous avez arrêté Ziagen en raison d'une réaction d'hypersensibilité, vous ne devez jamais reprendre Ziagen ou tout autre médicament contenant de l'abacavir / Trizivir : cela pourrait entraîner en quelques heures une mise en jeu du pronostic vital (avec hypotension artérielle), voire le décès. Restituez à la pharmacie les médicaments restants afin d'éviter toute reprise du médicament.