















**EPIVIR®**
**lamivudine (3TC) inhibiteur nucléosidique de la transcriptase inverse (INTI)**

<b>Médicament (taille réelle)</b>	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">   <b>300 mg</b> </div> <div style="text-align: center;">   <b>150 mg</b> </div> </div>
<b>Formes galéniques</b>	- Comprimé pelliculé à 300 mg (blanc) — flacon (PEHD) de 30. - Comprimé pelliculé à 150 mg (blanc) — flacon (PEHD) de 60. - Solution buvable à 10 mg/ml arôme <b>fraise-banane</b> (limpide, incolore à jaune pâle) — flacon (PEHD) de 240 ml avec pipette doseuse graduée 10 ml et adaptateur
<b>Conservation</b>	- Comprimés: température ambiante (< 25°C) à l'abri de la lumière - Solution buvable : < 25°C. Ne pas conserver plus d'un mois après ouverture

**En cas d'oubli, prendre dès que possible la dose oubliée, puis poursuivre le traitement comme auparavant. Ne pas prendre de dose double pour compenser la dose oubliée.**

Posologie usuelle	 lever	 petit déjeuner	 matinée	 midi	 après-midi	 dîner	 coucher	Administration
<b>Adultes et adolescents</b> 300 mg x 1/j  ou 150 mg x 2/j posologie selon CL.creat chez l'insuffisant rénal						 ou   		- Administration sans contraintes alimentaires  - Administration sans contraintes alimentaires
<b>Enfants</b> 4 mg/kg x 2/j		 prise				prise		- La solution buvable contient du saccharose (200 mg/ml) et du propylène glycol

<b>Contre-indications</b>	- Hypersensibilité connue à la lamivudine ou à l'un des excipients de la spécialité
<b>Interactions médicamenteuses cliniquement significatives (selon le GTIAM)</b>	* faible probabilité d'interactions métaboliques. * zalcitabine
<b>Principaux effets indésirables</b>	- Effets communs INTI : nausées, vomissements, <b>toxicité mitochondriale</b> (acidose lactique et hépatomégalie avec stéatose hépatique, rare mais potentiellement mortel) - Toxicité faible et transitoire - Cytopathie mitochondriale chez les nouveau-nés dont la mère a reçu l'association ZDV/3TC
<b>En pratique</b>	Epivir comprimé de 300mg permet une seule prise par jour (le matin ou le soir).