











**APTIVUS®**
**tipranavir - inhibiteur de la protéase (IP)**

Médicament (taille réelle)	
Formes galéniques	- Capsule molle 250 mg ; Flacon de 120 capsules - Contient 6,7 % d'éthanol (soit 4ml de bière ou 2ml de vin par prise) et de l'huile de ricin
Conservation	- Avant ouverture : A conserver au réfrigérateur (entre 2 et 8°C) ; Température ambiante (< 30°C) possible mais que sur une durée de 3 mois : inscrire sur emballage la date du retrait du réfrigérateur - Après ouverture : à utiliser dans les 60 j et à conserver à température ambiante (<30°C)

**En cas d'oubli, prendre dès que possible la dose oubliée, puis poursuivre le traitement comme auparavant. Ne pas prendre de dose double pour compenser la dose oubliée.**

Posologie usuelle	 lever	 petit déjeuner	 matinée	 midi	 après-midi	 dîner	 coucher	Administration
associé à NORVIR® (200 mg x 2/j)  Adultes 500 mg x 2/j								Une prise toutes les 12 heures. Ne doit être administré qu'avec de faibles doses de ritonavir (NORVIR®) : 200 mg matin et soir  - A prendre au cours du repas, sans être mâchées

Contre-indications	- Hypersensibilité connue au Tipranavir ou à l'un des excipients de la spécialité, ou au ritonavir associé - Insuffisance hépatique modérée ou sévère
Interactions médicamenteuses cliniquement significatives (selon le GTIAM)	* <b>contre indication</b> : rifampicine, millepertuis ( <i>Hypericum perforatum</i> ), amiodarone, astémizole, terféndine, bépripil, cisapride, ergotamine, dihydroergotamine, flécaïnide, propafénone, pimozide, sertindole, quinidine, simvastatine, lovastatine * <b>précaution d'emploi</b> : disulfirame, metronidazole, fluconazole, itraconazole, kétoconazole, voriconazole, rifabutine, clarithromycine, warfarine, halofantrine, ciclosporine, tacrolimus, sirolimus, corticoïdes, sildénafil, vardénafil, tadalafil, lopéramide, desipramine, théophylline, cimetidine, méthadone, mépéridine, triazolam, atorvastatine, contraceptif hormonal * <b>autres antirétroviraux</b> : ne pas utiliser en association avec : zidovudine, abacavir et les autres antiprotéases ; vigilance avec les autres antirétroviraux, notamment avec le Tenofovir et Didanosine
Principaux effets indésirables	- <b>Toxicité hépatique</b> : Hépatite, Insuffisance hépatique, Élévation des transaminases, hyperamylasémie, hyperbilirubinémie. - Atteintes des testicules retrouvées chez l'animal : des propositions de conservation du sperme pourront être faites - Effets communs des IP : <b>Anomalies du métabolisme glucidolipidique</b> (hypertriglycéridémie, hypercholestérolémie, résistance à l'insuline et hyperglycémie, apparition ou aggravation d'un diabète); <b>Troubles gastro-intestinaux</b> (nausée, diarrhée, flatulence, vomissement, douleur abdominale, dyspepsie) <b>Lipodystrophie</b> (redistribution de la masse grasse corporelle, diminution de la graisse périphérique sous-cutanée, augmentation de la graisse intra-abdominale, hypertrophie mammaire, accumulation de graisse rétrocervicale); <b>Augmentation des saignements spontanés</b> chez le patient hémophile; - Céphalée, troubles du sommeil, de l'humeur, tremblements
En pratique	A prendre au cours du repas en association avec le ritonavir (Norvir®). Du fait de multiples interactions, un suivi des taux plasmatiques des antirétroviraux associés au tipranavir est fortement recommandé. Un suivi hépatique et un dosage des triglycérides seront réalisés avant le début du traitement, à J15, J30 puis tous les mois A conserver au réfrigérateur avant ouverture ; Après ouverture, température ambiante à utiliser dans les 60 j