











## KALETRA® comprimé

lopinavir + ritonavir (LPV/r) - inhibiteur de la protéase (IP)

NB : LES DIFFERENCES VIS-A-VIS DE LA FORME CAPSULE SONT SOULIGNEES

Médicament (taille réelle)	
Formes galéniques	Comprimé pelliculé à 200 mg de lopinavir et 50 mg de ritonavir — Flacon (PEHD) de 120.
Conservation	Température ambiante (< 25°C)

**En cas d'oubli, prendre dès que possible la dose oubliée, puis poursuivre le traitement comme auparavant. Ne pas prendre de dose double pour compenser la dose oubliée.**

Posologie usuelle	 lever	 petit déjeuner	 matinée	 midi	 après-midi	 dîner	 coucher	Administration
Adultes et adolescents LPV/RTV : 400/100 mg x 2/j (augmenter la dose pour ajustement en cas d'association aux INNTI)								<p><u>Pas de contrainte vis-à-vis des repas</u></p> <p><u>Les comprimés doivent être avalés entiers avec un verre d'eau, sans être ni mâchés, ni coupés, ni broyés.</u></p>

<b>Contre-indications</b>	- Hypersensibilité connue à l'un des principes actifs ou excipients de la spécialité - Insuffisance hépatique sévère
<b>Interactions médicamenteuses cliniquement significatives (selon le GTIAM)</b>	* <b>contre indication</b> : astémizole, , bépridil, cisapride, , dihydroergotamine, ergotamine, , gestonorone, millepertuis, mizolastine, , pimozide, quinidine, rifampicine, simvastatine, vardenafin si > 75 ans. * <b>association déconseillé</b> : désogestrel, éthinylestradiol, étonogestrel, halofantrine, lévonorgestrel, lynestrérol, medroxyprogestérone, norethistérone, norgestriénone, primidone, rifabutine, sildénafil, triazolam, toltérodone * <b>précaution d'emploi</b> : acénocoumarol, aminophylline, atorvastatine, buprenorphine, carbamazépine, ciclosporine, clarithromycine, fentanyl, fluindione, fosphenytoïne, méthadone, phénytoïne, midazolam, phénobarbital, primidone, rifabutine, sirolimus, tacrolimus, tadalafil, théophylline, warfarine
<b>Principaux effets indésirables</b>	- Effets communs des IP : <b>Lipodystrophie</b> (redistribution de la masse grasse corporelle, diminution de la graisse périphérique sous-cutanée, augmentation de la graisse intra-abdominale, hypertrophie mammaire, accumulation de graisse rétrocervicale); <b>Anomalies du métabolisme glucidolipidique</b> (hypertriglycéridémie, hypercholestérolémie, résistance à l'insuline et hyperglycémie, apparition ou aggravation d'un diabète); <b>Troubles musculaires</b> (augmentation des CPK, myalgie, myosite, rhabdomyolyse); <b>Augmentation des saignements spontanés</b> chez le patient hémophile; <b>Troubles gastro-intestinaux</b> (nausée, diarrhée, flatulence, vomissement, douleur abdominale, dyspepsie) - Douleurs abdominales, diarrhées nausées, vomissements - Asthénie, céphalées, somnolence - Élévation des transaminases, amylases, gamma GT
<b>En Pratique</b>	La quantité de principe actif reste la même qu'avec les capsules mais le nombre de doses est plus faible (2 x 2 comprimés au lieu de 3 x 2 capsules) Par rapport à la forme capsule, cette forme comprimé présente d'autres avantages : pas de contrainte vis-à-vis des repas, conservation à température ambiante ; le changement d'excipients devrait améliorer la tolérance gastro intestinale.